

GASTROSKOPIA

DO ZNIECZULENIA POTRZEBNE BĘDĄ BADANIA KRWI

-MORFOLOGIA PODSTAWOWA, POTAS, SÓD (nie starsze niż 7 dni)

Przed badaniem należy odstawić leki rozrzedzające krew (czas odstawienia po konsultacji z lekarzem rodzinnym) oraz leki osłonowe na żołądek i preparaty zawierające żelazo.

Dzień przed badaniem oraz w dniu badania nie spożywamy płynów o ciemnym zabarwieniu oraz kawy.

W dniu badania bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków, a 4 godziny przed badaniem nie przyjmować żadnych płynów.

Osoby chorujące na cukrzycę powinny poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.

Jeśli pacjent zażywa, któryś z poniższych leków, wymagane jest odstawienie ich przed znieczuleniem:

- **OZEMPIC, WEGOWY** – na 3 tyg. przed badaniem,
- **SAXENDA, VICTOZA** – na 2 dni przed badaniem,
- **TRULICITY** – na 2 tyg. przed badaniem,
- **MOUNJARO** – na 15 dni przed badaniem.

Po badaniu wykonanym w znieczuleniu dożylnym nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów mechanicznych. Konieczna jest obecność osoby towarzyszącej od momentu rejestracji do samego wyjścia z placówki.