

Gastroskopia:

Przygotowanie:

W dniu badania pozostajemy na czczo

- nie wolno jeść minimum 8 godzin
- nie wolno pić 4 godziny.

W dniu poprzedzającym badanie, kolacja w małej ilości.

Leki, które pacjent przyjmuje na co dzień, może odstawić tylko na **zlecenie lekarza prowadzącego**.

W uzasadnionych przypadkach lekarz wystawiający skierowanie na badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, może zalecić wykonanie badania krwi - **INR** (wykrywające zaburzenia krzepnięcia krwi), by w przypadku pobierania wycinków, usuwania polipów nie doszło do krwawienia.

Badanie gastroskopii może odbyć się w znieczuleniu miejscowym bądź w znieczuleniu dożylnym prowadzonym przez lekarza anestezjologa.

Do badania w znieczuleniu dożylnym należy wykonać następujące badania z krwi: **morfologia pełna, sód, potas (elektrolity)**.

Jeśli badanie odbędzie się w znieczuleniu dożylnym, niezbędne jest, by towarzyszyła nam osoba, która będzie czuwała przy nas po badaniu, w drodze do domu.

Nie możemy w tym dniu samodzielnie prowadzić samochodu, należy pozostać w domu.

Kolonoskopia:

Przygotowanie:

- Tydzień przed badaniem nie spożywamy żywności z pestkami(truskawki, mak, wszelkiego rodzaju posypki itp.)
- Trzy dni przed planowanym badaniem, stosujemy dietę ubogoresztkową (m. in. jaja, chude mięso, świeże, niepanierowane, pieczone w folii ryby, makaron, ryż, kasza manna, klarowne buliny, gotowane warzywa ,owoce bez pestek, np jabłka, białe pieczywo, jogurty bez pestek, twarożki).

Wodę pić więcej niż zwykle.

Stosować się do zaleceń producenta wskazanego, przepisanego przez Lekarza Prowadzącego środka przeczyszczającego, a porozumieniu z naszą Pracownią otrzymają Państwo ściśle godziny przygotowania się preparatem (wypracowane w naszej Pracowni, dające doskonałe efekty oczyszczenia)

W uzasadnionych przypadkach lekarz wystawiający skierowanie na badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, może zlecić wykonanie

badanie krwi - **INR** (wykrywające zaburzenia krzepnięcia krwi), by w przypadku pobierania wycinków, usuwania polipów nie doszło do krwawienia.

Badanie kolonoskopii może odbyć się w znieczuleniu miejscowym bądź w znieczuleniu dożylnym (zalecane, refundowane przez NFZ) prowadzonym przez lekarza anestezjologa.

Do badania w znieczuleniu dożylnym należy wykonać następujące badania z krwi: **morfologia pełna, sód, potas (elektrolity).**

Leki, które pacjent przyjmuje na co dzień, może odstawić tylko na **zlecenie lekarza prowadzącego.**

Jeśli badanie odbędzie się w znieczuleniu dożylnym, niezbędne jest, by towarzyszyła nam osoba, która będzie czuwała przy nas po badaniu, w drodze do domu.

Nie możemy w tym dniu samodzielnie prowadzić samochodu, należy pozostać w domu.